
СКОТНЫЙ ДВОР®
ГЛУБОКАЯ ПОДСТИЛКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ (ФЕРМЕНТАЦИОННАЯ)



Дозировка:
0,5кг(1 банка) рассчитана на однократную обработку 50кв.м подстилочного материала. Повторная обработка - через 2-3 недели.



1 Для кого подходит?

Подходит для лошадей, коров, свиней, овец и коз, кроликов, собак, лис, хорьков и норок

2 Какая толщина подстилки рекомендуется?

Рекомендуемая толщина от 20 см, разогрев начинается от 30-40. Периодически нужно добавлять подстилочный материал и препарат.
Через 1,5 года подстилку можно убрать, использовать в качестве удобрения для растительных культур.

3 Как понять, работают или нет бактерии в подстилке?

Ошибочно считать, что если "не греет – не работает". Препарат уже работает, если уходит запах аммиака. Разогрев – это отдельная опция, которая появляется при соблюдении определенных условий: достижении толщины подстилки 30-40 см и оптимальной влажности. Особое внимание нужно обратить на влажность около поилок.

4 Какие температурные условия нужны?

- Если отопления нет, то закладывать препарат в подстилку нужно до наступления холодов, пока температура в помещении выше +5+10°С.
- Если же закладка происходит в холодное время, можно поставить обогреватель на время запуска. Также рекомендуем дополнительно «подкормить» бактерии. Для этого перед внесением препарат смешать с мукой, шротом или с соевой мукой.



БЕЗОПАСНО ДЛЯ ЛЮДЕЙ, ЖИВОТНЫХ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ!

5 Как начать использовать?

- пол очистить, обеззаразить (можно использовать для очистки средства типа "Белизна"), высушить;
- разложить на пол слой подстилочного материала толщиной 20см;
- рассыпать сверху дозу препарата (для более равномерного распределения препарат можно просеять через сито);
- завести коз на подстилку.

ВНИМАНИЕ! Препарат вносить в сухом виде! В составе препарата есть удерживающие влагу набухающие материалы – водой разводить НЕЛЬЗЯ!

Рекомендуется для формирования подстилки: стружки, опилки, резаная солома

6 Как понять, что подстилка НЕ запустилась?

Если в помещении присутствует запах аммиака, значит по какой-то причине бактерии не запустились.
Устранение запаха аммиака – главное действие препарата. В такой ситуации обратите внимание, все ли инструкции были соблюдены при запуске.

7 Оптимальная влажность подстилки - как определить?

Сильно сожмите в руке горсть подстилки. Если вытекает 3 капли и более – влажность избыточная, необходимо удалять жидкость: например, подсыпать сухой материал, увеличив толщину подстилки; 2-3 капли – оптимальная влажность.

Содержание на подстилке - это отдельная технология со своими требованиями и ограничениями. Есть типичные ошибки, и мы готовы консультировать фермеров по проблемам с подстилкой (не важно, каким препаратом они пользуются), принципы биологических процессов примерно одинаковы.



www.live-bacteria.ru
Служба поддержки и консультирования:
+7 (495) 775-65-54

СКОТНЫЙ ДВОР®
ГЛУБОКАЯ ПОДСТИЛКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ (ФЕРМЕНТАЦИОННАЯ)



Бактериальный биоактиватор для ферментационной подстилки (глубокой) Универсальный. Специально подобранные бактерии в препарате являются естественными пробиотиками. Эффективно разлагая органические отходы животных, подавляют болезнетворных микробов, клещей, гельминтов и т.п.

ДЕЙСТВИЕ ПРЕПАРАТА:

- компостирует навоз и солому в подстилке;
- расщепляет органические отходы;
- устраняет запах мочевины и навоза;
- уменьшает количество патогенных микроорганизмов;
- увеличивает периоды между чистками стойла;
- служит дополнительным источником тепла;
- улучшает качество и вкус мяса животных;
- укрепляет иммунитет, способствует хорошей выживаемости и росту молодняка;
- предотвращает болезни ротовой полости, пищеварительного тракта, вымени, ног и копыт животных;
- подходит для всех видов домашних животных;
- совместим со стружками, опилками, резаной соломой, шелухой;
- эффективно используется до 2 лет.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

- для подстилки можно использовать солому, стружку, опилки или их смесь. Перед применением тщательно вычистить и высушить пол помещения;
- разложить на пол подстилочный материал.;
- равномерно рассыпать биоактиватор по всей поверхности. Препарат использовать только в сухом виде;
- завести животных на подстилку. В дальнейшем обрабатывать подстилку 1 раз в 2-3 недели;
- по мере утаптывания добавлять материал подстилки;
- через 12-18 месяцев подстилку необходимо полностью заменить;
- отработанный материал можно использовать как компост.

СОСТАВ:

Микроорганизмы (неопасные по классификации ЕС, закон 2000/54/ЕС), каолин, диатомит, микрокристалличес кая целлюлоза.

БЕЗОПАСНО ДЛЯ ЛЮДЕЙ, ЖИВОТНЫХ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ!



ДОЗИРОВКА:

0,5 кг (1 банка) препарата рассчитана на однократную обработку 100 кв. м подстилки для свиней.
При использовании антибиотиков, дезинфицирующих средств на основе хлора, а также при использовании на старой подстилке, дозу следует увеличить.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- не содержит токсичных веществ, антибиотиков, генетически модифицированных и патогенных микроорганизмов;
- разрешен для использования в сельском хозяйстве на территории РФ и ТС ЕАЭС.;
- соответствует нормам Commission Regulation (EC) No. 889/2008 для органического производства и нормам безопасности директивы ЕС 1999/45/ЕС. ТУ 20.59.59-006-92610663-2020.

ПРИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ МИКРООРГАНИЗМЫ ГИБНУТ!

Хранить при температуре +5 до +25°С. Избегать влажности и резких колебаний температуры. Оберегать от прямых солнечных лучей.

ВЫПУСКАЕТСЯ В ФАСОВКЕ:

Пластмассовая банка, 500 г,



www.live-bacteria.ru
Служба поддержки и консультирования:
+7 (495) 775-65-54